



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE DIAZEPAM COMPRIMIDOS 10 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente a lo indicado por su médico.

Composición y Presentación: Diazepam Comprimidos 10 mg

Cada comprimido contiene:
Diazepam 10 mg

Excipientes: Almidón de Maíz, Glicolato Sódico de Almidón de Maíz - Tipo A, Colorante FD&C Azul N° 2, Gelatina, Estearato de Magnesio, Lactosa Monohidrato, c.s.

Envase con 20 comprimidos
Envase Clínico

Clasificación:

Benzodiazepina.

Indicación:

- Tratamiento de la ansiedad.
- Tratamiento coadyuvante de espasmos musculares.

Advertencias y Precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- La administración de Diazepam por tiempo prolongado o en altas dosis puede causar dependencia física o mental.
- La suspensión de la terapia debe realizarse en forma gradual.
- Diazepam puede afectar su capacidad para realizar actividades que requieran de alerta mental o coordinación física.
- Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia pulmonar crónica o apnea del sueño.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Alergia a Diazepam, otra benzodiazepina o cualquier componente de la formulación.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar al Médico o Farmacéutico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, especialmente: depresores del Sistema Nervioso Central, Disulfiram, Cimetidina, Levodopa, Ketoconazol, Digoxina, Nefazodona, medicamentos para el asma, resfrios o alergias, anticonceptivos orales, crisis convulsivas. Ud. no debe ingerir alcohol mientras toma este medicamento. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Presencia de otras enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al Médico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: enfermedades o depresión mentales, enfisema, asma, bronquitis u otra enfermedad pulmonar crónica, apnea del sueño, epilepsia, glaucoma, enfermedad renal o hepática, miastenia gravis, porfiria, abuso o dependencia de alcohol o drogas.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: ansiedad, confusión, pérdida de memoria, depresión mental, latidos cardíacos irregulares, agitación, convulsiones, conductas anormales, alucinaciones, rash.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: torpeza, somnolencia, fatiga, dolor o calambres abdominales, mareos, visión borrosa, cambios en el deseo sexual, náuseas, dolor de cabeza, irritación gástrica.

Forma de Administración:

Vía oral.

Dosis:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: Tratamiento de la ansiedad, crisis convulsivas y como relajante músculo esquelético: 2 a 10 mg. 4 veces al día. Para la abstinencia a: 10 mg. 3 o 4 veces al día durante las primeras 24 horas, luego la dosis puede ser disminuída a 5 mg. 3 o 4 veces al día según la evolución de cada paciente.

Sobredosis:

En caso de ingestión involuntaria, conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de atención médica.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.