



## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE ÁCIDO MEFENÁMICO COMPRIMIDOS

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.**

### **Composición y Presentación:**

#### **Ácido Mefenámico Comprimidos 250 mg**

Cada comprimido contiene:

Ácido Mefenámico 250 mg

Excipientes: Lauril Sulfato de Sodio, Glicolato Sódico de Almidón de Papa - Tipo A, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Dióxido de Titanio, Dióxido de Silicio Coloidal, Polividona, Lactosa Monohidrato c.s.

Envase con 10 comprimidos.

Envase Clínico.

#### **Ácido Mefenámico Comprimidos 500 mg**

Cada comprimido contiene:

Ácido Mefenámico 500 mg

Excipientes: Lauril Sulfato de Sodio, Glicolato Sódico de Almidón de Papa - Tipo A, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Dióxido de Titanio, Dióxido de Silicio Coloidal, Polividona, Lactosa Monohidrato c.s.

Envase con 10 comprimidos.

Envase Clínico.

### **Clasificación:**

Analgésico, antiinflamatorio no esteroidal.

### **Indicación:**

- Dolores leves a moderados de variada etiología.
- Alivio sintomático de la dismenorrea primaria.

### **Advertencias y Precauciones:**

#### **Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.**

- La administración por más de una semana debe ser con control médico.
- Administrar con precaución en pacientes con trastornos hepáticos o renales previos, presión sanguínea alta y/o insuficiencia cardíaca, enfermedades o infecciones respiratorias y con historia de enfermedades gastrointestinales, después de intervenciones quirúrgicas importantes y ancianos.
- El paciente debe evitar la automedicación con analgésicos y fármacos reductores de la fiebre mientras esté en tratamiento con este producto.
- Si se va a someter a una cirugía, incluyendo cirugía dental, informe a su Médico que está en tratamiento con este medicamento.

- Usted debe consultar a su Médico antes de usar AINEs (con excepción de Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca).
- Debe comunicar a su Médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

#### **Contraindicaciones:**

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Pacientes con hipersensibilidad a Ácido Mefenámico, Aspirina u otros antiinflamatorios no esteroidales o a cualquier componente de la formulación.
- Pacientes con úlcera gastrointestinal activa, daño renal severo.
- Embarazo y lactancia
- No se ha demostrado su seguridad y eficacia en niños menores de 14 años.
- No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de by-pass coronario.

#### **Interacciones:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones).

Ud debe comunicar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: anticoagulantes orales, Litio, corticoesteroides, Aspirina u otros antiinflamatorios no esteroidales, Ácido Valproico, fenitoína. Ud. no debe ingerir

Alcohol mientras toma este medicamento. No olvide mencionar que está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

#### **Efectos Adversos (no deseados)**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener.

Consulta inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: rash, urticaria, palpitaciones, respiración irregular, úlceras, diarrea, vómitos o deposiciones con sangre, agitación.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: malestar o dolor estomacal, vómitos, mareos, somnolencia, dolor de cabeza.

#### **Forma de Administración:**

Vía oral, preferentemente con las comidas.

#### **Dosis**

El médico debe indicar la dosis y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis recomendada es una dosis de 500 mg. Seguidos de 250 mg. cada 6 horas, por un período de 2 a 3 días en el caso de dismenorrea.

#### **Sobredosis**

Conduzca al Intoxicado a un Centro de Atención Médico.

#### **Condiciones de Almacenamiento**

Manténgase fuera del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz, humedad y a temperaturas inferiores a los 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

#### **NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO**

#### **NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940,  
Independencia, Santiago - Chile.