



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

BROMFIN® JARABE 8 mg / 5 mL

BROMHEXINA CLORHIDRATO

Lea todo el folleto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para Usted. Conserve este folleto, ya que puede tener que volver a leerlo. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Composición:

Cada 5 mL de Jarabe contiene:

Bromhexina Clorhidrato 8 mg

Excipientes: Sacralosa, Benzoato de Sodio, Ácido Tartárico, Glicerol, Sorbitol, Esencia de Limón, Esencia de Miel, Hidroxietilcelulosa, Agua c.s.p.

Clasificación:

Mucolítico y Expectorante.

Indicación:

Está indicada para el alivio de la tos producida por estados gripales. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, asma, enfisema o en tos seca.

Posología:

Vía de Administración: Oral.

El médico debe señalar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante las dosis usualmente recomendadas son :

Adultos: La dosis oral usual de Bromhexina Clorhidrato en adultos y niños mayores de 12 años es de 8 mg (5 mL; una cucharadita) cada 8 horas.

Niños: La dosis oral usual en niños entre 6-12 años es de 4 mg (2,5 mL; media cucharadita) cada 8 horas. Para niños de 2-6 años, la dosis recomendada es de 4 mg (2,5 mL; media cucharadita) cada 12 horas, o bien 0,5 mg/kg/día, dividido en dosis cada 8-12 horas. Usar el jarabe de 4mg/5 mL.

Advertencias y Precauciones:

Debe ser usada con precaución en pacientes con úlcera péptica, asma, daño renal o hepático.

Embarazo y lactancia:

No se recomienda su uso durante el embarazo ya que puede causar daño al feto. Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. No usar mientras se esté amamantando.

Paciente pediátrico:

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta al pediatra.

Si la tos persiste o se empeora transcurrido más de 7 días desde el inicio del tratamiento consulte a su médico.

Consulte inmediatamente a un médico en caso que le aparezcan lesiones o erupciones en la piel, después de haber iniciado el tratamiento con Bromhexina clorhidrato.

Contraindicaciones:

•Contraindicado en pacientes con antecedentes de Úlcera Péptica.

•Contraindicado en personas que hayan presentado alergia a Bromhexina Clorhidrato, a algún excipiente de la formulación, o alergia a Ambroxol.

•No se debe utilizar Bromhexina Clorhidrato para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, asma, enfisema o en tos seca.

Interacciones:

No se han informado interacciones medicamentosas clínicamente desfavorables para Bromhexina, sin embargo es recomendable que no se utilice en conjunto con otros medicamentos que disminuyan las secreciones bronquiales, como Atropina.

Efectos indeseables:

El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos indeseables, que normalmente no requieren atención médica: náuseas, dolor epigástrico y vómitos. En raros casos: dolor de cabeza, mareos, transpiración excesiva y reacciones alérgicas.

Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si nota cualquier efecto adverso no mencionado en este folleto, informe a su médico o farmacéutico.

Efecto sobre la capacidad de conducir y operar máquinas:

No se han realizado estudios sobre el efecto de Bromhexina clorhidrato sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria.

Sobredosis:

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido de la humedad y la luz, a no más de 30°C.

Fabricado y distribuido por Mintlab Co. S.A., Nueva Andrés Bello N° 1940, Independencia, Santiago.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**