

# MiLab

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE CEFADROXILO CÁPSULAS 500 mg

**Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.**

### **Composición y Presentación:**

Cada cápsula contiene:

Cefadroxilo (como Monohidrato) 500 mg

Excipientes: Dióxido de Silicio Coloidal, Estearato de Magnesio, Glicolato Sódico de Almidón de Maíz, tipo A, Lauril Sulfato de Sodio, Colorante FD&C Rojo N° 40, Colorante FD&C Azul N° 1, Dióxido de Titanio, Lactosa Monohidrato, c.s.

Envase con 8 cápsulas.

Envase Clínico.

### **Clasificación:**

Antibótico.

### **Indicación:**

Tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, piel y su estructura y del tracto genitourinario causadas por organismos susceptibles.

### **Advertencias y Precauciones:**

#### **Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.**

Es importante administrar Cefadroxilo por el tiempo completo de tratamiento prescrito.

El tratamiento con Cefadroxilo altera la flora normal y puede ocurrir un sobrecrecimiento de organismos no susceptibles, incluyendo hongos.

### **Contraindicaciones:**

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos: Alergia a Cefadroxilo, otra Cefalosporina o Penicilina, o alguno de los componentes de la formulación.

### **Interacciones:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo, por lo que Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, especialmente si se trata de: Heparina, anticoagulantes orales, Ácido Valproico, Probenecid, Pentoxifilina, Dipiridamol.

No olvide mencionar que está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen

**Presencia de otras Enfermedades:**

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad usted debe consultar al Médico o Farmacéutico antes de ingerir este medicamento, especialmente en los casos siguientes: alergia, sangramiento, enfermedad renal o hepática, antecedentes de enfermedad gastrointestinal, diabetes Mellitus.

**Efectos Adversos (no deseados):**

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente a su médico si alguno de estos síntomas ocurre: dolor abdominal severo, diarrea severa, convulsiones, reacciones de hipersensibilidad manifestadas por rash cutáneo, prurito, fiebre, escalofríos, edema, infección por candida.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea suave, dolor de estómago, irritación en la boca, lengua o vagina.

**Forma de Administración:**

Vía oral.

**Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

**Infecciones del Tracto Urinario:**

Para infecciones del tracto urinario, inferior no complicadas (es decir, cistitis), la dosis usual es de 1 ó 2 g por día en una dosis única o dividida en dos dosis iguales.

Para todas las demás infecciones del tracto urinario inferior, la dosis usual es de 2 g por día dividida en dos dosis iguales.

**Infecciones de la Piel y Estructura de la piel:**

Para Infecciones de la piel y estructura de la piel, la dosis usual es de 1 ó 2 g por día en una dosis única o dividida en dos dosis iguales.

**Faringitis y Amigdalitis:**

Causadas por Estreptococos betahemolíticos del grupo A. Tratamiento para la faringitis y amigdalitis causada por estreptococos betahemolíticos del grupo A-1 g por día en una dosis única o en dos dosis iguales por al menos 10 días.

**Infecciones de Tracto Respiratorio Superior e Inferior:**

Para infecciones leves, la dosis usual es de 1 g por día dividida en dos dosis iguales.

Para infecciones moderadas a severas, la dosificación recomendada es de 1 a 2 g diarios dividida en dos dosis iguales.

**Sobredosis:**

En caso de ingestión involuntaria conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

**Condiciones de Almacenamiento:**

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.

V1 / 550251 / 25.02.21

**MiLab**