Milab

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
FLUOXETINA COMPRIMIDOS 20 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Químico Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición y Presentación:
Cada comprimido contiene:
Fluoxetina (como Clorhidrato) 20 mg
Excipientes: Croscarmelosa Sódica , Lactosa Monohidrato Spray Dried, Dióxido Silícico Coloidal, Colorante FD&C laca amarillo N° 5, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, c.s.

Envase con 20 comprimidos.
Envase Clínico.

Clasificación:
Antidepresivo.

Indicación:
Tratamiento de la depresión con o sin ansiedad asociada, en desórdenes obsesivo-compulsivos y de la bulimia nerviosa.

Advertencias y Precauciones:
Úsese sólo por indicación médica y bajo supervisión médica.

- Administrar con precaución en pacientes con enfermedad al hígado, riñón o mental, anorexia, antecedentes de convulsiones, diabetes.
- Evite el consumo de Alcohol mientras está en tratamiento con este medicamento.
- Este medicamento puede causar en algunas personas mareos, somnolencia y/o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o realizar cualquier otra actividad que requiera de alerta.

Los pacientes, familiares o quienes estén a cargo de los pacientes deben estar alerta ante la aparición de síntomas tales como: empeoramiento de la depresión, aparición de ideas suicidas, intento de suicidio, aparición o empeoramiento de ansiedad, agitación, intranquilidad, ataques de pánico, aparición o empeoramiento de irritabilidad, conducta agresiva, hiperactividad extrema en acciones y conversación, entre otro cambios conductuales.Tales síntomas deben ser inmediatamente informados al médico tratante, especialmente si son severos, abruptos en aparición, se acentúan o no fueron parte de los síntomas iniciales del cuadro depresivo.

Algunos pacientes pueden encontrarse en riesgo de conductas suicidas causadas por antidepresivos debido a:
a) Enfermedad bipolar, llamada también maniaco- depresiva.
b) Antecedentes familiares de enfermedad bipolar.
c) Historia personal o familiar de intento de suicidio.

Contraindicaciones:
Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:
• Hipersensibilidad conocida a Fluoxetina o cualquier componente de la formulación.
• Embarazo y lactancia.

Interacciones:
El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos o alimentos, con consecuencias dañinas para su organismo,por lo que Ud. debe Informar a su Médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente: Inhibidores de la monoaminooxidasa, Imipramina, Amitriptilina otro antidepresivo, Diazepam u otra benzodiazepina, Buspirona, Litio, Haloperidol, anticoagulantes orales, Carbamazepina, Venlafaxina, Insulina, hipoglicemiantes, Astemizol, Fenitoína, gllcósidos cardiacos. Ud. no debe ingerir Alcohol mientras toma este medicamento.
No olvide mencionar que está tomando este medicamento en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso de que se someta a algún examen.

Efectos Adversos (no deseados):
Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: ansiedad, insomnio, picazón de la piel, tinte amarillo en la piel u ojos.

otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: dolor de cabeza, náuseas, diarrea, pérdida de peso, sequedad de la boca, vértigo o sensación de aturdimiento.

Forma de Administracion:
Vía Oral.

Dosis:
El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados para su caso particular.
No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 20 mg una vez al día.

Sobredosis:
En caso de sobredosis,conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

Condiciones de Almacenamiento:
Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25°C.
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

Elaborado y distribuido por MINTLAB Co. S.A. Nueva Andrés Bello 1940, Independencia, Santiago - Chile.

V1 / 550248 / 26.02.21

Mintlab