



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

PYRIPED FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 600 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este Medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada comprimido recubierto contiene:

Ibuprofeno 600 mg

Excipientes: Croscarmelosa Sódica, Lauril Sulfato de Sodio, Dióxido de silicio coloidal, Acido Estéarico Polvo, Povidona, Celulosa Microcristalina, Alcohol Polivinílico parcialmente hidrolizado, Macrogol 3000, Dióxido de Titanio, Talco Venecia.

Clasificación:

Antiinflamatorio no esterooidal, analgésico.

Indicaciones:

Tratamiento en procesos inflamatorios, dolorosos leves a moderados y/o estados febriles.

Vía de Administración:

Oral.

Advertencias:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- La administración por más de una semana debe ser con control médico.
- El tratamiento debe realizarse con la dosis más baja posible, especialmente si existen antecedentes de problemas renales o hepáticos.
- El paciente debe evitar la automedicación con analgésicos y fármacos reductores de la fiebre mientras esté en tratamiento con este producto.
- Ud. debe consultar a su Médico antes de usar AINEs (con excepción de Ácido Acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca).
- Debe comunicar a su Médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.

Contraindicaciones:

No usar en pacientes con (a menos que su Médico indique lo contrario):

- Pólipos nasales inducidos por Ácido Acetilsalicílico u otra reacción alérgica grave o de hipersensibilidad inducida por Ácido Acetilsalicílico, ibuprofeno u otros analgésicos o antiinflamatorios (por ejemplo Diclofenaco, Piroxicam, Fenilbutazona, Indometacina, etc) o a algún componente de la fórmula.
- Úlceras gastrointestinales.
- Insuficiencia renal severa.
- Insuficiencia hepática severa.
- Embarazo y lactancia.
- Niños menores de 12 años.
- No se debe usar AINEs con excepción de Ácido Acetilsalicílico en el periodo inmediato a un cirugía de by-pass coronario.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de los siguientes casos: diuréticos (ej: Furosemida, Hidroclorotiazida, Triamterena, etc.), medicamentos para el tratamiento de la presión alta, Colchicina, corticoides (ej: Betametasona, Prednisona, etc.), glucosidos cardiotónicos (ej: Digoxina), Litio, Metotrexato, Paracetamol, Ácido Acetilsalicílico, otros antiinflamatorios no esteroidales (ej: Diclofenaco, Piroxicam, Indometacina, Fenilbutazona, etc.), suplementos de potasio, hipoglucemiantes orales (ej: Clorpropamida, Glibenclámda, Tolbutamida, Metformina, etc.), Insulina, Heparina, anticoagulantes (ej: Akenocumarol), antiagregantes plaquetarios (ej: Ticlopidina), trombolíticos, Ácido Valproico, Cefamandol, Cefeporazona, Cefotetan, Ciclosporina, sales de oro, Plicamicina, Probenecid.

Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. Ud. debe comunicar a su Médico si padece de alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes: alcoholismo, problemas de coagulación, enfermedades del sistema digestivo, úlceras digestivas, diabetes mellitus, enfermedades hepáticas o renales, enfermedades respiratorias o nasales o de cualquier tipo, Lupus eritematoso sistémico, anemia, epilepsia, retención de líquido (hinchazón de pies o pantorrillas), enfermedades cardíacas, presión alta, bajo recuento plaquetario o de glóbulos blancos, polimialgia reumática, porfiria, artritis temporal, úlceras, lesiones o manchas blancas en la boca, inflamación de entes o después de intervenciones quirúrgicas (incluyendo los procedimientos dentales).

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. Discontinúe el uso de este producto y consulte inmediatamente al Médico si presenta algunos de los síntomas siguientes: ardor o molestias abdominales, vómitos de aspecto café o con sangre, calambres abdominales, sangre en deposiciones o en flema, rinitis (sangre de nariz) sin explicación, erupción de la piel, irritación de la mucosa bucal, irregularidades menstruales o sangramiento vaginal, edema (hinchazón en cualquier parte del cuerpo), cualquier alteración urinaria, como por ejemplo cambios en el color de ésta, o si se presenta turbia, dolor al orinar y/o sensación frecuente de orinar, cambios en la cantidad de orina, etc., desmayos, alteraciones respiratorias o del pulso cardíaco, tos, convulsiones, fiebre, sangramiento exagerado de cortes y heridas, tinnitus (sentir campanillas dentro del oído) u otras alteraciones auditivas, dolor ocular, visión borrosa, alucinaciones, confusión, aumento de presión arterial, calambres, dolor de cabeza severo, irritación de la lengua, calambres musculares, coloración amarilla de piel u ojos, debilidad o cansancio inusual.

Pueden ocurrir otros efectos no deseados que usualmente no requieren atención médica y que desaparecen con el uso (adaptación del organismo al medicamento). No obstante si continúan o se intensifican debe comunicarlo a su Médico.

Entre éstos pueden presentarse nerviosismo e irritabilidad, sensación de plenitud, constipación (estreñimiento), apetito disminuido, diarrea, náuseas o vómitos leves y de corta duración, dolor de cabeza leve a moderado. También se ha reportado vértigos y somnolencia, si a Ud le ocurre, se recomienda no conducir u operar maquinarias que requieran de concentración. Si Ud, nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte a su Médico.

Precauciones:

Los ancianos son usualmente más sensibles al efecto de los antiinflamatorios no esteroidales que los adultos jóvenes, por lo que se recomienda precaución en su administración en estos casos.

Administrar con suma precaución en pacientes con enfermedad renal o hepática.

Modo de Empleo:

Via oral. Úsese este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más o con mayor frecuencia de la que su Médico le indique. Para disminuir las molestias de estómago, se puede tomar con alimentos o con un antiácido, o según indique su Médico.

No se tienda o acueste en un plazo inferior a 30 minutos después de administrado. Evite ingerir bebidas alcohólicas mientras esté en tratamiento.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 400 a 800 mg tres ó cuatro veces al día.

Sobredosis:

En caso de sobredosis o intoxicación, acuda al servicio Asistencial más cercano y lleve este folleto.

Síntomas: en caso de sobredosis pueden aparecer trastornos al Sistema Nervioso Central, como letargia, somnolencia y convulsiones, así como dolores abdominales, malestar y vómitos. Además efectos cardiovasculares, y también trastornos funcionales hepáticos y renales.

Tratamiento:

No se conoce antídoto para ibuprofeno.

Si sospecha de una intoxicación o sobredosis, habiendo o no síntomas, usted debe trasladar al paciente a un Centro Asistencial cuanto antes.

Condiciones de Almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz, humedad y a no más de 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**